



### 5.7 רגל של תרנגול הודו. פתחו את השוק כדי להראות חלק

**מצומת הגידין.** הגידים של תרנגול הודו שונים קצת מגידים

של שאר עופות. בשאר עופות, הגידים לא מגיעים ליותר מגובה חצי הרגל וכמו שכתב הרמ"א (נ"ו ט') דלעולם אין צומת הגידין למעלה מחצי עצם האמצעי, אולם כבר כתב הערוך השולחן (נ"ו י"ח) שבתרנגול הודו הגידים נמשכים הרבה מעל לחצי הרגל (אמנם היד יהודה (סי' נ"ו פי' הקצר סקי"ז וסקכ"ו) חולק וס"ל שאף בתרנגולי הודו אין צומת הגידין למעלה מחצי העצם, וכפשטות דברי הרמ"א שכתב דלעולם אין וכו'). ועוד יש שוני, שהגידים של שאר העופות גמישים (flexible)

ואילו הגידים של תרנגולי הודו קשים והם דומים קצת לעצמות (ומש"ה כתב הדרכ"ת (נ"ו נ"ח) דאפשר שמה שכתב הרמ"א, בסי' נ"ו סעיף ט', שאין אנו בקיאים בבדיקת צומת הגידין של עוף משום דקשה לבדוק, לא קאי אתרנגול הודו מכיוון שהגידים שבתרנגול הודו קשים והם ניכרים טפי).



### 5.7 השוק והרגל התחתונה

**של תרנגול.** צומת הגידין הן הגידים

הנמשכים מהשרירים של השוק עד לאצבעות. כאשר

נחתך (בחיי העוף) אפילו רק אחד מן הגידים שבחצי התחתון של השוק,

העוף טרף. לאחר השחיטה, קודם למליחה, נוהגים לחתוך מעל לאצבעות

וכמו שכתב הרמ"א (סי' ס"ה סעי' ג') דנוהגים לחתוך בירכי העופות בפרק

הארכובה התחתונה משום שלפעמים נמצאים חוטים אדומים ברגלי העופות וע"י

החיתוך יכול הדם לצאת בשעת המליחה.